



จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

Sub district Administrative Organization Thungluknok

<http://www.thungluknok.go.th>

ฉบับประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑



ระวังพิษสุนัขบ้า

(ผู้ติดเชื้อรักษาไม่ได้ ตายอย่างเดียว)

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคและสถานเสาวภา เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พบหมา – แมว ติดเชื้อแล้ว ๒๔๗ ตัว สูงกว่าปีที่ผ่านมา ๑.๕ เท่า คนตายแล้ว ๓ ราย ในปี ๒๕๖๐ มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ๘ ราย



“น้ำลาย” แหล่งแพร่เชื้อ

สังเกต ๓ ระยะ “อันตราย”

- ระยะเริ่มแรก ☞ แยกตัว “ไม่เล่นกับเจ้าของ หงุดหงิด” ม่านตาขยาย ไม่ตอบสนองต่อแสง ๒ – ๓ วัน ก่อนเข้าระยะตื่นเต้น
- ระยะตื่นเต้น ☞ กระวนกระวาย ตื่นเต้น “ดุร้าย กัดทุกสิ่งที่ขวางหน้า เสียงเห่าหอนผิดไป” ลิ้นห้อย น้ำลายไหล ๑ – ๗ วันก่อนเข้าระยะอัมพาต
- ระยะอัมพาต ☞ ขาอ่อนเปลี้ย ล้มแล้วลุกไม่ได้ อัมพาตทั้งตัวแล้ว “ตาย”

โรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาสเกิดขึ้นใน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทุกชนิด
ป้องกันได้โดย พาไปฉีดวัคซีนทุกปี



ทำอย่างไรเมื่อถูกกัด

๑. ล้างแผลด้วยน้ำกับสบู่หลายๆ ครั้ง ทำแผลด้วยแอลกอฮอล์และเบตาดีน
๒. กักสัตว์ไว้เพื่อดูอาการ สอบถามประวัติการฉีดวัคซีนจากเจ้าของสัตว์
๓. พบแพทย์ทันที (โดยเฉพาะหากถูกสัตว์จรจัดกัด)

หากโดนกัด รีบพบแพทย์ ฉีดวัคซีนใน ๒ วัน

กักสัตว์ที่กัดไว้ สังเกตอาการ ๑๐ วัน

ระยะอาการของคนที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

- ระยะที่ ๑ ☞ มีไข้ คล้ายไข้หวัด เบื่ออาหาร ค้นแผล (๒ – ๓ วัน)
- ระยะที่ ๒ ☞ มีอาการทางประสาท คลุ้มคลั่ง กลั้วน้ำ กลั้วลม ความรู้สึกไว (๓ – ๗ วัน)
- ระยะที่ ๓ ☞ อัมพาต หายใจกระตุก คลุ้มคลั่งตาย (๑ – ๗ วัน)

ที่มา : กรมควบคุมโรค/สถานเสาวภา, www.facebook.com/setthakithospital
จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก